

NUEVA FÓRMULA

VETGASTRIL[®] PLUS



VETGASTRIL[®] PLUS

GEL

NUEVA FORMULA

Especies de destino:



Fórmula de ayuda ante desequilibrios gástricos,
favoreciendo una correcta digestión.



Cada ml contiene:

- Hojas de *Aloe barbadensis* **1,00 g**
- Queratina hidrolizada **220 mg**
- Alginato de sodio **20,0 mg**
- Hialuronato sódico **9,00 mg**
- Sulfato de condroitina **9,00 mg**
- Cinc **5,00 mg**

Recomendación de uso:

Vetgastril[®] plus aporta nutrientes de ayuda en la **digestión**.

Modo de empleo:

Gatos:

- <5 kg de peso corporal: 1 ml/día.
- >5 kg de peso corporal: 2 ml/día.

Perros:

- <5 kg de peso corporal: 1 ml/día.
- 5-10 kg de peso corporal: 2 ml/día.
- 10-15 kg de peso corporal: 3 ml/día.
- 15-20 kg de peso corporal: 4 ml/día.
- 20-25 kg de peso corporal: 5 ml/día.

Hurones, roedores y aves (por kg de peso corporal):

0,2 ml/día.

Agitar antes de usar. Gel oral. Tomar 1-2 h antes del alimento habitual. Si se prefiere, repartir en 2 tomas cada 12 horas. Los animales deberán tener acceso permanente al agua

Presentación:

- Estuche con envase de 20 ml con jeringa dosificadora. Suspensión vía oral.
- Estuche con envase de 50 ml con jeringa dosificadora. Suspensión vía oral.

Caducidad preferente: 2 años.



Sin Colorantes

NUEVO

COMPRIMIDOS

VETGASTRIL[®] PLUS

Especies de destino:



Fórmula de ayuda ante desequilibrios gástricos,
favoreciendo una correcta digestión.



Cada ml contiene:

- Extracto de hojas secas de *Aloe barbadensis* **20,0 g**
- Queratina hidrolizada **880 mg**
- Alginato de sodio **80,0 mg**
- Hialuronato sódico **36,0 mg**
- Sulfato de condroitina **36,0 mg**
- Cinc **20,0 mg**

Recomendación de uso:

Vetgastril[®] plus aporta nutrientes de ayuda en la **digestión**.

Modo de empleo:

Perros:

- 10-20 kg de peso corporal: 0,5 Comprimidos/día.
- 20-30 kg de peso corporal: 1 Comprimidos/día.
- 30-40 kg de peso corporal: 1,5 Comprimidos/día.
- 40-50 kg de peso corporal: 2 Comprimidos/día.
- 50-60 kg de peso corporal: 2,5 Comprimidos/día.
- >60 kg de peso corporal: 3 Comprimidos/día.

Vía oral. Tomar 1-2 h antes del alimento habitual.

Si se prefiere, repartir en 2 tomas cada 12 horas.

Los animales deberán tener acceso permanente al agua.

Presentación:

Envase clínico con 48 comprimidos, en blíster de 6 comprimidos cada uno, y sobres de dispensación.

Caducidad preferente: 2 años.



Sin Colorantes